

Alameda Alliance for Health Medicamentos para la dependencia de opioides



Opioides que requieren receta médica: analgésicos

En Alameda Alliance for Health (Alliance), estamos aquí para ayudarle a hacerse cargo de su salud. Puede usar esta guía como ayuda para controlar su consumo de opioides.

Incluso cuando los opioides se toman como lo indicó el médico, pueden causar dependencia o adicción. Para tratar la dependencia de opioides, los médicos combinan medicamentos con terapia conductual. Esto se llama tratamiento asistido por medicamentos (Medication-Assisted Treatment, MAT).

Medicamentos para reducir el deseo de consumir opioides

Si le resulta difícil controlar su consumo de opioides, el MAT puede ayudarle. Pregunte a su médico sobre medicamentos para reducir el deseo de consumir opioides.

Los siguientes tres (3) medicamentos pueden funcionar para usted:

- 1. Buprenorfina:** es una opción más segura para el dolor y puede ayudar a evitar el deseo de consumir opioides.
- 2. Metadona:** engaña al cerebro para que piense que aún recibe opioides. Esta se entrega en una clínica del programa de tratamiento de opioides (Opioid Treatment Program, OTP).
- 3. Naltrexona:** disminuye el deseo de tomar opioides. Esta se entrega en el consultorio médico.



Medicamentos para neutralizar la sobredosis

Naloxona: puede salvar a alguien de una sobredosis de opioides. Comienza a funcionar dentro de dos (2) a tres (3) minutos. Es un medicamento en aerosol (imagen de la izquierda) o en un dispositivo de inyección (imagen de la derecha) y ambos son fáciles de usar.



Ejemplos de naloxona

¿Necesita más ayuda? Llame a los Programas de Salud de Alliance
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.
Número de teléfono: **1.510.747.4577**
Personas con problemas auditivos y del habla (CRS/TTY):
711/1.800.735.2929
www.alamedaalliance.org

ALAMEDA
Alliance
FOR HEALTH