
STI

性傳播感染 [STI]

什麼是STI?

- STI是性行為過程中得到的感染。
- STI可能會影響任何發生性行為的人士。包括女性和男性,與男性有性行為的男性,以及與女性有性行為的女性。
- STI的種類共有超過20種。每一種皆以其自己的方式傳播,並會導致嚴重的健康問題。



- 您可能會經由親密的性接觸(如陰道、肛門以及口交)而感染STI。 大部分的STI病菌存活在溫暖、潮濕的區域。口、直腸和性器官是病 菌的最佳溫床。
- 多數患有STI的人不知道他們得了STI,而且可能會傳染其他人。

預防STI

- 避免感染STI的最佳方式是不進行陰道性交、口交或肛門性交。這稱為 禁慾。
- 您可以注射疫苗以幫助防止HPV和乙肝感染。拜訪您的醫生或到您的診 所就診。
- 件侶間互相都只有單一配偶,能夠降低風險。 同意只與一個人有活躍的性關係。但首先, 您和您的伴侶應進行STI檢查。與您的伴侶 開誠布公地談一談。



Health care you can count on. Service you can trust.

STI: 性傳播感染

- 減少伴侶的數量。別忘記進行檢查並將 檢查結果告知彼此。
- 每次進行肛門性交、陰道性交或口交時,都應使用保險套。使用乳膠或塑膠的保險套,檢查有效期,並閱讀包裝說明。

認為自己可能感染了STI?

- STI相當常見,在各類人群身上都有可能 發生。
- 不要不好意思!您如何得到此病並不要 緊。讓您的醫生或診所爲您檢查。
- 如果您年齡為12歲或以上,您不需父母或監護人的同意即可獲得STI護理。
- 大部分的STI可以用藥物治療。確保您以 正確的方式服用藥物。僅使用為您開具 的處方藥。
- 您的伴侶可能也受到感染。告訴他們或 請他人告知他們,以讓他們也接受治 療。

當您患有STI,您可能有一或多項以下的 症狀。

- 從陰道或陰莖釋出分泌物
- 排尿時有燒灼/疼痛感
- 腹股溝區疼痛或觸痛
- 生殖器部位潰瘍
- 有些STI沒有症狀。

常見的STI:

披衣菌 生殖器疣

淋病 B型肝炎

泡疹 愛滋病毒/愛滋病

梅毒 人類乳頭瘤狀病毒

您不必獨自面對這些!

如需瞭解更多有關STI的資訊, 請致電Alliance Health Programs,

電話號碼:510-747-4577。

免費電話:1-877-932-2738;

加州中繼轉接電話服務 (CRS)/TTY

專線:711或1-800-735-2929;

服務時間為週一至週五 早上8點至下午5點。

www.alamedaalliance.org

已授予權限可使用和複製這些資料於非營利 教育性用途,前提是未經Alameda Alliance for Health許可,不得修改內容。



Health care you can count on. Service you can trust.