

Hable con el médico o la enfermera de su hijo sobre las vacunas recomendadas para su edad.

| | Gripe <i>Influenza</i> | vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina (Tdap) | VPH Virus del papiloma humano | Antimeningocócica | | Neumococo | Hepatitis B | Hepatitis A | Poliomielitis inactivada | Triple viral Sarampión, paperas, rubéola | Varicela |
|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------------|---|---|-----------|-------------|-------------|-----------------------------|--|----------|
| | | | | Antimeningocócica conjugada (MenACWY) | Antimeningocócica del grupo B (MenB) | | | | | | |
| De 7 a 8 años | Green | Orange | | Purple | | Purple | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| De 9 a 10 años | Green | Orange | Purple, Blue | Purple | | Purple | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| De 11 a 12 años | Green | Orange | Green | Green, Orange | | Purple | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| De 13 a 15 años | Green | Orange | Orange | Orange | | Purple | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| De 16 a 18 años | Green | Orange | Orange | Green, Orange | Blue | Purple | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |

Para obtener más información:

Los preadolescentes y adolescentes deben vacunarse contra la gripe cada año.

Los preadolescentes y los adolescentes deben recibir una dosis de Tdap a la edad de 11 o 12 años.

Todos los niños de 11 y 12 años deben recibir una serie de 2 vacunas contra el VPH con al menos 6 meses de diferencia. Se necesita una serie de 3 vacunas para aquellos con sistemas inmunes débiles y mayores de 15 años.

Todos los niños de 11 y 12 años deben recibir una vacuna antimeningocócica conjugada (MenACWY). Se recomienda una vacuna de refuerzo a los 16 años.

Los adolescentes de 16 a 18 años, **pueden** recibir la vacuna antimeningocócica del grupo B (MenB).



Estas casillas sombreadas indican cuándo se recomienda la vacuna para todos los niños, a menos que su médico le indique que su hijo no puede recibir la vacuna de manera segura.



Estas casillas sombreadas indican que la vacuna se recomienda para niños con ciertas afecciones de salud o con condiciones de vida que los ponen en un mayor riesgo de enfermedades graves. Consulte las recomendaciones específicas de vacunas en www.cdc.gov/vaccines/pubs/ACIP-list.htm.



Estas casillas sombreadas indican que la vacuna debe administrarse si un niño se está poniendo al día con las vacunas olvidadas.



Esta casilla sombreada indica que los niños que no estén en riesgo alto pueden vacunarse si lo desean después de hablar con un proveedor.



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

